CONNAISSEZ LES FAITS :

SPASMES INFANTILES

ET ENCÉPHALOPATHIE HYPOXIQUE ISCHÉMIQUE

Les spasmes infantiles, qui peuvent également se transformer en syndrome de West, surviennent dans moins de 6 cas pour 10 000 naissances vivantes dans la population générale.

Plusieurs troubles sous-jacents peuvent être impliqués dans les spasmes infantiles, notamment l'HIE, les troubles métaboliques et les troubles génétiques.

Le taux d'épilepsie chez les enfants atteints d'EHI peut atteindre 33 %, les spasmes infantiles représentant environ 25 % des cas d'épilepsie qui commencent au cours de la première année de vie.

L'apparition de l'IS se produit généralement au cours de la première année de vie, le plus souvent entre
De 4 à 8 mois. Et ils s'arrêtent généralement avec l'âge.
2 à 4 ans.

À QUOI RESSEMBLENT LES SPASMES INFANTILES ?

Les crises associées aux spasmes infantiles se manifestent souvent par une flexion soudaine du corps vers l'avant, accompagnée d'un raidissement des bras et des jambes, durant une à deux secondes. Les spasmes surviennent généralement au réveil et se manifestent souvent par de multiples groupes, avec des centaines de crises par jour.

Il est essentiel de commencer le traitement le plus tôt possible. Les spasmes infantiles persistants peuvent avoir un impact négatif sur tous les aspects du développement cérébral. Une étude a montré qu'un retard de traitement d'une semaine seulement pouvait avoir des conséquences durables.

Le traitement standard des spasmes infantiles comprend plusieurs formes de thérapie hormonale, notamment l'hormone adrénocorticotrope (ACTH) ou la prednisolone, ou le médicament antiépileptique vigabatrin.

STOP AUX SPASMES INFANTILES

La Child Neurology Foundation fournit le dispositif mnémotechnique « STOP » pour aider les parents à reconnaître les spasmes infantiles et encourager un traitement rapide.

S	SEE THE SIGNS	Groupes de mouvements soudains, répétés et incontrôlés, comme des mouvements de tête ou des craquements du corps.
T	TAKE A VIDEO	Notez les symptômes et parlez-en immédiatement à votre médecin.
O	OBTAIN A DIAGNOSIS	Confirmez un schéma d'ondes cérébrales irrégulier avec un test EEG.
P	PRIORITIZE TREATMENT	Mettre fin aux spasmes pour minimiser les retards de développement