ਤੱਥ ਜਾਣੋ:

ਇ ਨ ਫੈਂ ਟਾ ਈ ਲ ਸ ਪੈ ਸ ਮ

ਅਤੇ ਹਾਈਪੌਕਸਿਕ ਇਸਕੇਮਿਕ ਐਨਸੈਫਲੋਪੈਥੀ

ਇਨਫੈਂਟਾਈਲ ਸਪੈਸਮ, ਜੋ ਕਿ ਵੈਸਟ ਸਿੰਡਰੋਮ ਵਿੱਚ ਵੀ ਬਦਲ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਆਮ ਆਬਾਦੀ ਵਿੱਚ ਹਰ 10,000 ਜੀਵਤ ਜਨਮਾਂ ਵਿੱਚੋਂ 6 ਤੋਂ ਘੱਟ ਮਾਮਲਿਆਂ ਵਿੱਚ ਹੁੰਦਾ ਹੈ।

ਇਨਫੈਂਟਾਈਲ ਸਪੈਸਮ ਦੇ ਨਾਲ ਕਈ ਅੰਤਰੀਵ ਵਿਕਾਰ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋ ਸਕਦੇ ਹਨ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ HIE, ਮੈਟਾਬੋਲਿਕ ਵਿਕਾਰ ਅਤੇ ਜੈਨੇਟਿਕ ਵਿਕਾਰ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ।

HIE ਵਾਲੇ ਬੱਚਿਆਂ ਵਿੱਚ ਮਿਰਗੀ ਦੀ ਦਰ 33 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਤੱਕ ਵੱਧ ਹੈ, ਇਨਫੈਂਟਾਈਲ ਸਪੈਸਮਜ਼ ਜੀਵਨ ਦੇ ਪਹਿਲੇ ਸਾਲ ਵਿੱਚ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਣ ਵਾਲੇ ਮਿਰਗੀ ਦੇ ਲਗਭਗ 25 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਕੇਸ ਬਣਾਉਂਦੇ ਹਨ।

IS ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਆਮ ਤੌਰ 'ਤੇ ਜੀਵਨ ਦੇ ਪਹਿਲੇ ਸਾਲ ਵਿੱਚ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਆਮ ਤੌਰ 'ਤੇ ਵਿਚਕਾਰ 4 ਤੋਂ 8 ਮਹੀਨੇ। ਅਤੇ ਇਹ ਆਮ ਤੌਰ 'ਤੇ ਉਮਰ ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਰੁਕ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। 2 ਤੋਂ 4 ਸਾਲ।

ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਕੜਵੱਲ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਦਿਖਾਈ ਦਿੰਦੇ ਹਨ?

ਇਨਫੈਂਟਾਈਲ ਸਪੈਸਮ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਦੌਰੇ ਅਕਸਰ ਸਰੀਰ ਦੇ ਅਚਾਨਕ ਅੱਗੇ ਝੁਕਣ ਵਾਂਗ ਦਿਖਾਈ ਦਿੰਦੇ ਹਨ ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਬਾਹਾਂ ਅਤੇ ਲੱਤਾਂ ਦਾ ਅਕੜਾਅ 1-2 ਸਕਿੰਟਾਂ ਤੱਕ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ। ਸਪੈਸਮ ਜਾਗਣ 'ਤੇ ਹੁੰਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਅਕਸਰ ਕਈ ਸਮੂਹਾਂ ਵਿੱਚ ਹੁੰਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਪ੍ਰਤੀ ਦਿਨ ਸੈਂਕੜੇ ਦੌਰੇ ਪੈਂਦੇ ਹਨ।

ਜਿੰਨੀ ਜਲਦੀ ਹੋ ਸਕੇ ਇਲਾਜ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨਾ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਬੱਚਿਆਂ ਵਿੱਚ ਚੱਲ ਰਹੇ ਕੜਵੱਲ ਦਿਮਾਗ ਦੇ ਵਿਕਾਸ ਦੇ ਸਾਰੇ ਪਹਿਲੂਆਂ 'ਤੇ ਮਾੜਾ ਪ੍ਰਭਾਵ ਪਾਉਣ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਰੱਖਦੇ ਹਨ। ਇੱਕ ਅਧਿਐਨ ਨੇ ਦਿਖਾਇਆ ਹੈ ਕਿ ਇਲਾਜ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਹਫ਼ਤੇ ਤੋਂ ਘੱਟ ਦੇਰੀ ਕਰਨ ਨਾਲ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਤੱਕ ਚੱਲਣ ਵਾਲੇ ਪ੍ਰਭਾਵ ਪੈ ਸਕਦੇ ਹਨ।

ਇਨਫੈਂਟਾਈਲ ਸਪੈਸਮ ਲਈ ਮਿਆਰੀ ਇਲਾਜ ਵਿੱਚ ਹਾਰਮੋਨਲ ਥੈਰੇਪੀ ਦੇ ਕਈ ਰੂਪ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਐਡਰੇਨੋਕਾਰਟੀਕੋਟ੍ਰੋਫਿਕ ਹਾਰਮੋਨ (ACTH) ਜਾਂ ਪ੍ਰੇਡਨੀਸੋਲੋਨ), ਜਾਂ ਦੌਰੇ-ਰੋਕੂ ਦਵਾਈ ਵਿਗਾਬੈਟ੍ਰਿਕਨ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ।

ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਕੜਵੱਲ ਬੰਦ ਕਰੋ

ਚਾਈਲਡ ਨਿਊਰੋਲੋਜੀ ਫਾਊਂਡੇਸ਼ਨ ਮਾਪਿਆਂ ਨੂੰ ਇਨਫੈਂਟਾਈਲ ਸਪੈਸਮ ਦੀ ਪਛਾਣ ਕਰਨ ਅਤੇ ਤੇਜ਼ ਇਲਾਜ ਨੂੰ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਮਦਦ ਕਰਨ ਲਈ "STOP" ਮੈਮੋਨਿਕ ਡਿਵਾਈਸ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਦੀ ਹੈ।

S	**SEE THE SIGNS**	ਅਚਾਨਕ, ਵਾਰ-ਵਾਰ, ਬੇਕਾਬੂ ਹਰਕਤਾਂ ਦੇ ਸਮੂਹ ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਸਿਰ ਹਿਲਾਉਣਾ ਜਾਂ ਸਰੀਰ ਦਾ ਕੁੜਕਣਾ।
T	**TAKE A VIDEO**	ਲੱਛਣਾਂ ਨੂੰ ਰਿਕਾਰਡ ਕਰੋ ਅਤੇ ਤੁਰੰਤ ਆਪਣੇ ਡਾਕਟਰ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰੋ।
O	**OBTAIN A DIAGNOSIS**	EEG ਟੈਸਟ ਨਾਲ ਅਨਿਯਮਿਤ ਦਿਮਾਗੀ ਤਰੰਗ ਪੈਟਰਨ ਦੀ ਪੁਸ਼ਟੀ ਕਰੋ।
P	**PRIORITIZE TREATMENT**	ਵਿਕਾਸ ਸੰਬੰਧੀ ਦੇਰੀ ਨੂੰ ਘੱਟ ਕਰਨ ਲਈ ਕੜਵੱਲ ਖਤਮ ਕਰੋ