التشنجات الطفولية

تعرف على المخاطر

يتعرض الناجون من النوبات عند الأطفال حديثي الولادة لخطر الإصابة بالتشنجات الرضعية (IS).

إن تحديد المخاطر والتنبؤ بها قد يؤدي إلى تحسين الوقت المستغرق للوصول إلى التشخيص والعلاج.
الوقت هو الدماغ.

NSR NEONATAL SEIZURE REGISTRY

تم تحديد ثلاثة عوامل خطر* في أحدث الأبحاث المنشورة:

تخطيط كهربية الدماغ غير طبيعي بشكل حاد

تخطيط كهربية الدماغ عند حديثي الولادة غير طبيعي بشدة أو ⩽3 أيام مع نوبات مسجلة على تخطيط كهربية الدماغ

إصابة المهاد أو العقد القاعدية أو جذع الدماغ في التصوير بالرنين المغناطيسي

نغمة غير طبيعية في فحص حديثي الولادة

إذا كان طفلك معرضًا لخطر كبير:

تعرف على العلامات (infantilespasms.org)

- **ابق على اتصال مع طبيب أعصاب الأطفال وناقش معه خطة استباقية للتقييم والعلاج.**

عتبات المخاطر:

الأطفال الذين لم يتم تحديد عوامل الخطر لديهم أعلاه معرضون لخطر منخفض جدًا للإصابة بـ IS

- **أكثر من نصف الأطفال الذين يعانون من عوامل الخطر الثلاثة المذكورة أعلاه يصابون بـ IS**

لمعرفة المزيد: https://neonatalseizureregistry.ucsf.edu

*نُشر في مجلة الصرع: https://doi.org/10.1111/EPI.16749