嬰兒痙攣症
了解風險

NSR NEONATAL SEIZURE REGISTRY

新生兒癲癇發作的倖存者有患嬰兒痙攣症 (IS) 的風險。

識別和預測風險可以縮短診斷和治療時間。

時間是關鍵。

了解更多: https://neonatalseizureregistry.ucsf.edu

*癲癇症相關資料的網頁: https://doi.org/10.1111/EPI.16749

嬰兒痙攣症
了解風險

最新發表的研究確定了三個風險因素*:

1 **腦電圖嚴重異常**
新生兒腦電圖嚴重異常或腦電圖記錄癲癇發作≥3天

2 **MRI 顯示丘腦、基底神經節或腦幹損傷**

3 **新生兒檢查異常**

風險臨界點:

- **沒有上述風險因素**的兒童患嬰兒痙攣症的**風險非常低**
- 超過一半的**具備上述三個風險因素**的兒童會發展為嬰兒痙攣症

如果您的孩子屬於高風險:

- 了解病發特徵 (infantilespasms.org)
- 與兒童神經科醫生保持聯繫，及早主動擬訂評估和治療計劃。

了解更多: https://neonatalseizureregistry.ucsf.edu

*癲癇症相關資料的網頁: https://doi.org/10.1111/EPI.16749