HIE

ما هو HIE؟

نقص الاكسجين (نقص الاكسجة)
إقفاري (الحد من تدفق الدم)
اعتلال دماغي (يؤثر على الدماغ)

حقائق سريعةعن HIE

40-50%
تم تطور إعاقة

50-70%
اختبر نوبات الصرع

75-80%
ينجو > سنوات 2

HIE يمكن أن يتسبب في حالات مرضية أخرى

الصرع، بما في ذلك نوبات صرع نادرة محددة مثل تشنجات الأطفال، ومتلازمة لينوكس غاستو & ESES، والشلل الدماغي، وضعف البصر، وضعف السمع، ومشاكل التغذية، وفروق التعلم والاهتمام، والتوحد، وتحديات الأداء التنفيذي، على سبيل المثال لا الحصر.

علاجات HIE

عند الولادة، يكون انخفاض حرارة الجسم (التبريد) علاجا مؤكدا لتقليل الوفاة والعجز. وهناك علاجات أخرى قيد التطوير للمبتدئين. وقد ثبت أن علاجات التدخل المبكر القائمة على الأدلة، مثل العلاج الطبيعي والمهني وعلاج النطق، تحسن النتائج.

كم عدد الأطفال الذين تم تشخيصهم بمرض اعتلال الدماغ الإقفاري نقص الأكسجين؟

يحدث في 2-3 لكل 1000 ولادة حية وفي بعض حالات الأطفال في مرحلة الطفولة

تتضمن بعض الأسباب الشائعة ما يلي:

- قصور المشيمة
- تمزق الرحم
- انفصال المشيمة
- ضغط الحبل
- الحبل القفوي
- اضطرابات تخثر الدم لدى الأمهات
- نزيف الجنين والام
- الصدمة أثناء الولادة
- جلطات الدم المشيمية
- عسر ولادة الكتف
- توقف القلب وقرب متلازمة موت الرضع المفاجئ في مرحلة الطفولة

HOPE for HIE
awareness • education • support

مهمتنا

تحسين نوعية حياة الأطفال والأسر المتأثرة بنقص تروية الدماغ الإقفاري لدى الأطفال من خلال التوعية والتعليم والدعم

تواصل معنا @HOPEFORHIE & HOPEFORHIE.ORG