HIE

מה זה HIE?

היפוקסי (חוסר חמצן)
איסכמי (הגבלת זרימת הדם)
אנצפלופתיה (משפיעה על המוח)

עובדות מהירות

40-50% מפתחים מוגבלויות

50-70% חווים התקפים

75-80% שורדים > שנתיים

כמה תינוקות מאובחנים עם HIE?

HIE מתרחש ב-2-3 לכל 1,000 לידות חי ובמקרים מסוימים בילדים בילדות.

HIE יכול לגרום למצבים אחרים

אפילפסיה, כולל אפילפסיות נדירות ספציפיות כמו עוויתות תינוקות, תסמונת לנוקס-גסטו ו-ESES, שיתוק מוחין, לקויות ראייה, לקויות שמיעה, בעיות האכלה, הבדלי ולקויות למידה וקשב, אוטיזם, אתגרי תפקודים ניהוליים, אם למנות רק כמה.

כמה סיבות נפוצות כוללות:

- אי ספיקה שלייתית
- קרע ברחם
- קרע שליה
- דחיסת חבל הטבור
- כריכת חבל הטבור סביב הצוואר
- הפרעות קרישת דם אצל האם
- דימום עוברי אימהי
- טראומה במהלך הלידה
- קרישי דם בשליה
- דיסטוציה של הכתף
- דום לב ומוות בעריסה (כמעט מוות בעריסה) בילדות

טיפולי HIE

בלידה, היפותרמיה טיפולית (קירור) היא טיפול מוכח להפחתת תמותה ומוגבלות. טיפולים אחרים נמצאים בפיתוח לקראת תחילת המחלה. טיפולים התערבות מוקדמת מבוססי ראיות, כגון פיזיותרפיה, ריפוי בעיסוק וטיפול בדיבור, הוכחו כמשפרים את התוצאות.

המשימה שלנו

לשפר את איכות חייהם של ילדים ומשפחות שנפגעו מ-HIE בילודים ובילדים באמצעות מודעות, חינוך ותמיכה.

התחברו @HOPEFORHIE ו-HOPEFORHIE.ORG