HIE 缺氧 缺血性 脑病

(氧气不足) (血流减少) (脑部疾病)

多少新生儿会患HIE？

每一千个新生儿中大约有2-3例HIE患者。在儿童中也有患HIE的个例。

HIE的病因是什么？

- 胎盘功能不全
- 子宫破裂
- 胎盘早剥
- 脐带压迫
- 脐带绕颈
- 母体凝血障碍
- 胎母输血综合征
- 分娩中受到创伤
- 胎盘血块
- 肩难产
- 儿童时期的心脏骤停和濒临婴儿猝死事件

HIE患者相关数据

75-80%
存活两年以上

50-70%
患有癫痫症

40-50%
未来患有脑疾

HIE可能导致的并发症

癫痫，包括婴儿痉挛症等罕见癫痫症；Lennox-Gastaut综合征(LGS)和睡眠中癫痫性电持续状态(ESES)；脑性瘫痪；视力障碍；听力障碍；进食问题；学习、注意力方面的变化和残疾；自闭症；执行功能障碍；等等。

HIE的治疗

研究表明，出生后使用临床低温疗法(降温)可降低死亡和残疾的概率。病发时可用的疗法目前还在被探索中。研究也表明，运动理疗、职业理疗、语言理疗等循证的早期干预治疗可有效改善治疗结果。

HOPE for HIE

awareness • education • support

认知 • 教育 • 支援

我们的使命

通过普及认知、教育、和支援以提高被HIE(新生儿或后天性儿童缺氧缺血性脑病)影响的孩童及其家庭的生活质量。

联系方式: @HOPEFORHIE 或 HOPEFORHIE.ORG