EHI

O QUE É EHI?

HIPÓXICO (FALTA DE OXIGÊNIO)
ISQUÊMICO (RESTRIÇÃO DO FLUXO SANGUÍNEO)
ENCEFALOPATIA (IMPACTANDO O CÉREBRO)

QUANTOS BEBÊS SÃO DIAGNOSTICADOS COM EHI?

A EHI ocorre em 2-3 por 1.000 nascidos vivos e em alguns casos pediátricos na infância.

ALGUMAS CAUSAS COMUNS INCLUEM:

- Insuficiência Placentária
- Ruptura Uterina
- Descolamento da placenta
- Compressão do cordão umbilical
- Cordão Nucal
- Distúrbios da coagulação sanguínea materna
- Hemorragia Materno-Fetal
- Trauma durante o parto
- Coágulos sanguíneos da placenta
- Distocia de Ombro
- Parada cardíaca e quase SMSL na infância

FATOS RÁPIDOS

75-80% SOBREVIVEM > 2 ANOS

50-70% SOFREM CONVULSÕES

40-50% DESENVOLVEM DEFICIÊNCIAS

EHI PODE CAUSAR OUTRAS CONDIÇÕES

Epilepsia, incluindo epilepsias raras específicas, como espasmos infantis, síndrome de Lennox-Gastaut e ESES, paralisia cerebral, deficiências visuais, deficiências auditivas, problemas de alimentação, diferenças e deficiências de aprendizagem e atenção, autismo, desafios de função executiva, para citar alguns.

TRATAMENTOS DE EHI

Ao nascer, a hipotermia terapêutica (resfriamento) é uma terapia comprovada para reduzir a mortalidade e a incapacidade. Outras terapias estão em desenvolvimento para o início do tratamento. Terapias de intervenção precoce baseadas em evidências, como Fisioterapia, Terapia Ocupacional e Fonoaudiologia, demonstraram melhorar os resultados.

HOPE for HIE

NOSSA MISSÃO

Melhorar a qualidade de vida de crianças e famílias afetadas pela EHI adquirida neonatal e pediátrica por meio de conscientização, educação e apoio.

CONNECT @HOPEFORHIE E HOPEFORHIE.ORG