HIE

HIE ਕੀ ਹੈ?

ਹਾਈਪੋਕਸਿਕ (ਆਕਸੀਜਨ ਦੀ ਘਾਟ)
ਇਸਕੇਮਿਕ (ਖੂਨ ਦੇ ਪ੍ਰਵਾਹ ਨੂੰ ਸੀਮਤ ਕਰਨਾ)
ਐਨਸੇਫੈਲੋਪੈਥੀ (ਦਿਮਾਗ ਨੂੰ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਕਰਨਾ)

ਕਿੰਨੇ ਬੱਚਿਆਂ ਵਿੱਚ HIE ਦਾ ਪਤਾ ਲੱਗਿਆ ਹੈ?

HIE ਪ੍ਰਤੀ 1,000 ਜੀਵਤ ਜਨਮਾਂ ਵਿੱਚ 2-3 ਵਿੱਚ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਕੁਝ ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਮਾਮਲਿਆਂ ਵਿੱਚ ਬਚਪਨ ਵਿੱਚ ਹੁੰਦਾ ਹੈ।

ਕੁਝ ਆਮ ਕਾਰਨਾਂ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ:

- ਪਲੇਸੈਂਟਲ ਦੀ ਘਾਟ
- ਬੱਚੇਦਾਨੀ ਦਾ ਫਟਣਾ
- ਪਲੈਸੈਂਟਲ ਫਟਣਾ
- ਰੱਸੀ ਦਾ ਸੰਕੁਚਨ
- ਨੂਚਲ ਕੋਰਡ
- ਮਾਵਾਂ ਦੇ ਖੂਨ ਦੇ ਜੰਮਣ ਦੇ ਵਿਕਾਰ
- ਭਰੂਣ ਦੇ ਮਾਵਾਂ ਦੇ ਖੂਨ ਵਹਿਣਾ
- ਜਣੇਪੇ ਦੌਰਾਨ ਸਦਮਾ
- ਪਲੇਸੈਂਟਲ ਖੂਨ ਦੇ ਗਤਲੇ
- ਮੋਢੇ ਦੀ ਡਾਇਸਟੋਸੀਆ
- ਬਚਪਨ ਵਿੱਚ ਦਿਲ ਦਾ ਦੌਰਾ ਅਤੇ ਨੇੜੇ SIDS

ਤੇਜ਼ ਤੱਥ ਇਹ ਹਨ

75-80% ਬਚਿਆ > 2 ਸਾਲ

50-70% ਨੂੰ ਦੌਰੇ ਪੈਂਦੇ ਹਨ

40-50% ਵਿਕਾਸਸ਼ੀਲ ਅਪੰਗਤਾਵਾਂ

ਇਹ ਹੋਰ ਹਾਲਾਤਾਂ ਦਾ ਕਾਰਨ ਬਣ ਸਕਦਾ ਹੈ

ਮਿਰਗੀ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਕੁਝ ਖਾਸ ਦੁਰਲੱਭ ਮਿਰਗੀ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਇਨਫੈਂਟਾਈਲ ਸਪੈਸਮ, ਲੈਨੋਕਸ-ਗੈਸਟੌਟ ਸਿੰਡਰੋਮ ਅਤੇ ਈਐਸਈਐਸ, ਸੇਰੇਬ੍ਰਲ ਪਾਲਸੀ, ਨਜ਼ਰ ਕਮਜ਼ੋਰੀ, ਸੁਣਨ ਦੀ ਕਮਜ਼ੋਰੀ, ਖੁਰਾਕ ਸੰਬੰਧੀ ਮੁੱਦੇ, ਸਿੱਖਣ ਅਤੇ ਧਿਆਨ ਵਿੱਚ ਅੰਤਰ ਅਤੇ ਅਪੰਗਤਾਵਾਂ, ਔਟਿਜ਼ਮ, ਕਾਰਜਕਾਰੀ ਕਾਰਜਸ਼ੀਲ ਚੁਣੌਤੀਆਂ, ਕੁਝ ਨਾਮ ਦੇਣ ਲਈ।

HIE ਇਲਾਜ

ਜਨਮ ਸਮੇਂ, ਥੈਰੇਪੀਉਟਿਕ ਹਾਈਪੋਥਰਮੀਆ (ਕੂਲਿੰਗ) ਮੌਤ ਅਤੇ ਅਪੰਗਤਾ ਨੂੰ ਘਟਾਉਣ ਲਈ ਇੱਕ ਸਾਬਤ ਥੈਰੇਪੀ ਹੈ। ਹੋਰ ਥੈਰੇਪੀਉਗ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਲਈ ਵਿਕਾਸ ਅਧੀਨ ਹਨ। ਸਬੂਤ-ਅਧਾਰਤ, ਸ਼ੁਰੂਆਤੀ ਦਖਲਅੰਦਾਜ਼ੀ ਥੈਰੇਪੀਆਂ ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਸਰੀਰਕ, ਕਿੱਤਾਮੁਖੀ ਅਤੇ ਸਪੀਚ ਥੈਰੇਪੀ ਨਤੀਜਿਆਂ ਨੂੰ ਬਿਹਤਰ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਦਿਖਾਈਆਂ ਗਈਆਂ ਹਨ।

HOPE for HIE

ਸਾਡਾ ਮਿਸ਼ਨ

ਜਾਗਰੂਕਤਾ, ਸਿੱਖਿਆ ਅਤੇ ਸਹਾਇਤਾ ਰਾਹੀਂ ਨਵਜੰਮੇ ਅਤੇ ਬਾਲ ਰੋਗਾਂ ਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਾਪਤ HIE ਤੋਂ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਬੱਚਿਆਂ ਅਤੇ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਲਈ ਦੀ ਗੁਣਵੱਤਾ ਵਿੱਚ ਸੁਧਾਰ ਕਰਨਾ।

CONNECT @HOPEFORHIE &
HOPEFORHIE.ORG