EHI

QUE ES EHI?

ENCEFELOPATÍA (LESIÓN AL CEREBRO)
ISQUÉMICA (REDUCCION DE FLUJO SANGUÍNEO)
HIPÓXICO (FALTA DE OXIGENO)

CUANTOS BEBÉS SON DIAGNOSTICADOS CON EHI?

La EHI ocurre en 2-3 de cada 1000 nacidos vivos, y en algunos casos pediátricos en la infancia.

ALGUNAS CAUSAS COMUNES INCLUYEN:

- Insuficiencia Placentaria
- Ruptura Uterina
- Desprendimiento de Placenta
- Compresión del Cordón
- Cordón Nucal
- Trastornos de la Coagulación Sanguínea Materna
- Hemorragia Fetomaterna
- Trauma Durante el Parto
- Coágulos de Sangre Placentarios
- Distocia de Hombros
- Paro Cardiaco y casi SMSL (SIDS) en la Infancia

DATOS RÁPIDOS DE LA EHI

75-80% SOBREVIVE> 2 AÑOS

50-70% SUFRE CONVULSIONES

40-50% DESARROLLA DISCAPACIDADES

EHI PUEDE CAUSAR OTRAS CONDICIONES

Epilepsia, incluidas epilepsias raras específicas como espasmos infantiles, síndrome de Lennox-Gastaut y ESES, parálisis cerebral, problemas de visión, problemas de audición, problemas de alimentación, diferencias y discapacidades de aprendizaje y atención, autismo, desafíos del funcionamiento ejecutivo, por nombrar algunos.

TRATAMIENTOS PARA LA EHI

Al nacer, la hipotermia terapéutica (enfriamiento) es una terapia comprobada para disminuir la muerte y la discapacidad. Se están desarrollando otras terapias para el inicio. Se ha demostrado que las terapias de intervención temprana basadas en la evidencia, como la terapia física, ocupacional y del habla, mejoran los resultados.

HOPE for HIE

NUESTRA MISIÓN

Mejorar la calidad de vida de los niños y las familias afectados por la EHI neonatal y pediátrica a través de la concienciación, la educación y el apoyo.

CONECTAR: @HOPEFORHIE & HOPEFORHIE.ORG